

شایع ترین علامت آپاندیسیت حاد، درد ، در قسمت پایین و راست شکم است

شایع ترین علامت آپاندیسیت حاد، درد شکم در قسمت پایین و راست شکم می باشد. دکتر علی طارمیها، متخصص جراحی عمومی و سوختگی، ضمن بیان این موضوع، اظهار کرد: آپاندیس زائده ای کرمی شکل است که در ابتدای روده بزرگ و در محل تلاقی سه نوار عضلانی آن (عضلات طولی روده بزرگ) قرار دارد و بطور معمول در سطح داخلی و پشتی آن قرار دارد. نوک آپاندیس می تواند در موقعیت های مختلف در داخل شکم قرار گیرد و همین موضوع باعث می شود نوک ملتهب آپاندیس، باعث تحریک صفاق جداری و درد در نقاط مختلف شکم شده که تشخیص آپاندیس را از سایر علل درد شکم، مشکل می کند. بطور معمول، شیوع آپاندیسیت در اواخر دهه دوم و اوایل دهه سوم زندگی بوده و علت آن افزایش رشد بافت های لنفاوی درون آن است که باعث تُنک شدن دهانه خروجی آپاندیس می شود.

عوامل دیگری که باعث افزایش تورم و انسداد دهانه خروجی آپاندیس می شود، منجر به بسته شدن دهانه خروجی آن شده و از طرفی چون ترشح مخاط آپاندیس ادامه می یابد، می تواند به افزایش فشار داخل آپاندیس، نرسیدن خون به جدار آن و سیاه شدنش منجر شود؛ در نهایت، ترشحات آپاندیس به داخل حفره شکم ریخته و پریتونیت و آبسه ایجاد می شود که اگر در این مرحله، بیمار تحت درمان قرار نگیرد، می تواند باعث عوارض شده و حتی منجر به مرگ او شود.

مُسکن، علائم بیماری را بدتر می کند

سیاه شدن از نوک آپاندیس شروع می شود و همین التهاب آن باعث درد شکم، تهوع و استفراغ می شود؛ از آنجایی که این علائم، بویژه در اطفال شایع است، والدین با دادن مُسکن سعی در درمان می کنند که در آپاندیسیت، باعث بدتر شدن علائم و پیشرفت بیماری می شود.

در صورتی که فردی دچار درد شکم، تهوع و استفراغ شد و پس از گذشت شش ساعت، این علائم، بهبود پیدا نکرد، باید با متخصصان جراحی مشاوره شود، زیرا آنان با تجربه ای که در طی گذراندن دوره تخصصی خود پیدا می کنند، می توانند با انجام معاینه یا معاینات مکرر تا حد زیادی تشخیص موارد شکم حاد نیازمند به جراحی شکم را تشخیص دهند. هر چند برای تشخیص دقیق، آزمایش خون و ادرار و انجام سونوگرافی و سی تی اسکن، کمک کننده خواهند بود، ولی هیچ کدام از آنها نمی توانند جایگزین معاینه جراح شود.